

Uniformité des points rationnels sur tous les corps quadratiques

Dan Abramovich

Résumé. Nous précisons un résultat de L. Caporaso, J. Harris et B. Mazur: la conjecture de Lang entraîne que le nombre des points rationnels d'une courbe de genre $g > 1$ est borné uniformément. Nous montrons que cette conjecture entraîne que ce nombre est borné uniformément pour tous les corps quadratiques.

Uniformity of rational points over all quadratic fields

Abstract. We refine a result of L. Caporaso, J. Harris and B. Mazur, who showed that Lang's conjecture implies that the number of rational points on a curve of genus $g > 1$ is uniformly bounded. We show that the conjecture implies that this number is bounded uniformly over all quadratic fields.

Soit K un corps de nombres. Selon une conjecture bien connue de S. Lang (voir [3], conjecture 5.7) l'ensemble des points K -rationnels d'une variété de type général n'est pas dense (pour la topologie de Zariski). Un travail récent de L. Caporaso, J. Harris et B. Mazur [1] montre que cette conjecture entraîne l'existence d'une borne supérieure universelle pour le nombre des points K -rationnels d'une courbe lisse de genre fixé $g > 1$. L'ingrédient géométrique principal dans leur travail est le suivant: si $X \rightarrow B$ est une famille de courbes de genre > 1 , il existe n tel que la puissance relative X_B^n domine une variété de type général.

Nous allons démontrer un résultat plus précis:

Théorème 1 *Supposons que la conjecture de Lang soit vraie. Soit K un corps des nombres et $g > 1$ un entier. Il existe un nombre $N(K, g)$ tel que si L est une extension de degré ≤ 3 de K et C est une courbe lisse projective connexe, de genre g définie sur L on a*

$$\#C(L) < N(K, g).$$

Remarques. Le cas $d = 1$ est traité dans [1]. Nous ne donnerons la démonstration en détail que lorsque $d = 2$. Voir la remarque au début de cette note pour le cas $d = 3$.

On peut se demander s'il y a un énoncé analogue avec "degré ≤ 3 " remplacé par "degré $\leq d$ ", où d est un entier quelconque. La question à été posée par F. Hajir.

Je tiens à remercier E. Izadi et J.-P. Serre de m'avoir aidé à améliorer la qualité de l'exposition et de la traduction française de ce manuscrit.

Préliminaires sur les familles de courbes. Soit $\pi : X \rightarrow B$ une K -famille de courbes, c'est à dire un morphisme projectif lisse de variétés sur K , dont les fibres sont des courbes géométriquement irréductibles. On écrit: $Y_n = \text{Sym}^2(X_B^n)$; soit $B' \subset \text{Sym}^2 B$, posons $Y_{n,B'} = (\text{Sym}^2(X_B^n))|_{B'}$. Soient L un corps quadratique sur K et σ l'involution qui fixe K . Soient $b \in B(L)$, et $P_1, \dots, P_n \in X_b(L)$. On dispose d'un point K -rationnel $y_{(P_1, \dots, P_n)}$ de Y_n :

$$y_{(P_1, \dots, P_n)} = \{(P_1, \dots, P_n), (P_1, \dots, P_n)^\sigma\}.$$

Terminologie: Une K -variété X est dite *de Lang* si $X_{\overline{K}}$ domine une variété de type général.

Proposition 1 *Supposons que les fibres de $X \rightarrow B$ soient de genre > 1 , et soit $B' \subset (B)^2/S_2$ une sous-variété. Il existe un entier $n > 0$ tel que $Y_{n,B'}$ soit une variété de Lang.*

Démonstration: Voir [1], chapitre 4-5: l'argument de [1] 5.1 et 5.2 montre qu'il suffit de considérer le cas suivant: soit $X \rightarrow B$ une famille de variation maximale ayant une action d'un groupe fini G , on doit montrer que pour n assez grand, la variété $Sym^2(X_B^n)/G$ est de type général; ce qui est démontré dans [1] 4.3.

[B. Hassett [2] a démontré un résultat plus fort, en utilisant la théorie des surfaces stables de Kollár et Shepherd-Barron: une puissance relative assez grande d'une famille de surfaces de type général est une variété de Lang.]

Vu la proposition 1, la conjecture de Lang dit que l'ensemble des points rationnels de $Y_{n,B'}$ n'est pas dense. Donc nous devons contrôler les points d'une sous-variété $D \subset Y_{n,B'}$, qui possède un morphisme $D \rightarrow Y_{n-1}$ de dimension relative ≤ 1 . La proposition suivante nous y aidera:

Proposition 2 *Soit $f : D \rightarrow Z$ une famille plate de dimension relative pure 1. Supposons que toute composante irréductible d'une fibre géométrique est de genre géométrique ≥ 2 . Alors, pour n assez grand, toute composante irréductible de D_Z^n est une variété de Lang.*

Démonstration: Nous allons nous ramener au cas où les fibres sont irréductibles, traité dans [1]. On peut supposer $K = \overline{K}$, D irréductible et normale, et on peut remplacer Z par un ouvert, de sorte qu'on peut supposer f lisse. Soit $D \xrightarrow{f'} Z' \rightarrow Z$ la factorisation de Stein de f ; les fibres de f' sont connexes. Si $z \in Z$ est un point général, posons $D_z = \cup_{1 \leq i \leq c} C_i$, où les C_i sont les composantes connexes de D_z . Soit M une composante connexe de D_Z^n pour n quelconque. Au-dessus de z , la fibre de M est formée de n -tuples de points $(P_j)_{j=1}^n$. Pour tout i il existe un ensemble d'indices J_i tel que pour $j \in J_i$ on a $P_j \in C_i$. Choisissons J_i de cardinal $\geq n/c$. Si n est assez grand, alors $\#J_i = n_i$ l'est aussi. Nous disposons d'un morphisme $M \rightarrow D_Z^{J_i} \cong D_Z^{n_i}$. L'image de M dans $D_Z^{J_i}$ est la sous-variété $D_Z^{J_i}$ des n_i -tuples de points qui sont contenus dans la même composante d'une fibre de f . D'après [1], si n_i est assez grand $D_Z^{J_i}$ est une variété de Lang, donc M l'est aussi.

Nous aurons besoin d'un résultat semblable à proposition 2, où D n'est pas de dimension relative pure 1. Commençons par un lemme facile.

Lemme 1 *Soit $D \rightarrow Z$ un morphisme génériquement fini, et soit Δ_n la "grande diagonale" de D_Z^n (des n -tuples des points tels que au moins deux entre eux sont égaux). Alors il existe un entier n tel que $(D_Z^n \setminus \Delta_n) \rightarrow Z$ n'est pas dominant.*

Démonstration: Si le degré générique de $D \rightarrow Z$ est au plus $n - 1$, alors chaque n -tuple des points dans une fibre générale contiens au moins deux points égaux.

Proposition 3 *Soit $D \rightarrow Z$ de dimension relative générique 1, tel que toute composante irréductible de dimension 1 d'une fibre générale est de genre géométrique au moins 2, et soit Δ_n la grande diagonale de D_Z^n . Alors pour n assez grand, toute composante irréductible de $D_Z^n \setminus \Delta_n$ qui domine Z est une variété de Lang.*

Démonstration: Résulte de la proposition 2 et du lemme 1.

Démonstration du théorème. La base B de la famille des courbes que nous utiliserons est le schéma de Hilbert qui paramétrise les courbes lisses projectives connexes de genre g

plongées par un système linéaire 3-canonique dans un espace projectif. La famille X est la courbe universelle au-dessus de B . Chaque courbe lisse projective connexe de genre g définie sur un corps de nombres L est isomorphe à une fibre au-dessus d'un point $b \in B(L)$.

Notation: Soit $m > n$. Nous disons que $y_{(P_1, \dots, P_n)} \in Y_n(K)$ est *m-prolongeable* s'il exist un corps L , $[L : K] = 2$, et une "prolongation" $y_{(P_1, \dots, P_m)} \in Y_m(K)$ tel que pour $1 \leq i \leq m$ on ait $P_i \in X(L) \setminus X(K)$ et pour $1 \leq i \neq j \leq n$ on ait $P_i \neq P_j$. Nous notons E_n^m l'ensemble des points *m-prolongeable*, et $F_n^m = \overline{E_n^m}$ l'adhérence de Zariski de E_n^m .

Nous devons démontrer que $F_n^m = \emptyset$ pour m assez grand.

Lemme 2 *Pour tout n il existe $m(n)$ tel que $F_n^{m(n)+k} = F_n^{m(n)}$ pour k positif quelconque.*

Pour n fixé, les variétés F_n^m sont fermées décroissantes dans l'espace noetherien Y_n .

Notation: $F_n = F_n^{m(n)}$.

Lemme 3 *Soit $I \subset \{1, 2, \dots, n'\}$ un n -tuple. La projection $\pi_I : F_{n'} \rightarrow F_n$ est surjective.*

Démonstration: $\pi_I(E_{n'}^m) = E_n^m$.

Nous disposons d'un morphisme naturel $\pi_{n,k} : F_{n+k} \rightarrow (F_{n+1})_{F_n}^k$. Notons que $\pi_{n,k}(E_{n+k}^{m(n+k)}) \subset (F_{n+1})_{F_n}^k \setminus \Delta_k$, par définition. Alors le lemme 1, avec $D = F_{n+1}$ et $Z = F_n$ entraîne le lemme suivant:

Lemme 4 *Soit $y \in F_n$. La dimension de la fibre de F_{n+1} au-dessus de y est ≥ 1 .*

Lemme 4bis: *Soit $y \in F_n$. La dimension de la fibre de F_{n+k} au-dessus de y est $\geq k$.*

Démonstration: Induction sur k et Lemme 4.

Lemme 5 *Supposons que la conjecture de Lang soit vraie. Soit $y \in F_n$. Alors la dimension de la fibre de F_{n+1} au dessus de y est 2.*

Démonstration: Supposons qu'il existe une composante irréductible de F_{n+1} dont les fibres générales sont de dimension < 2 . Le lemme 4 dit que les fibres sont de dimension 1, donc la dimension relative de $(F_{n+1})_{F_n}^k$ est k . De plus, le lemme 4bis entraîne que la dimension relative de F_{n+k} est k aussi. Donc il existe au moins une composante irréductible H_k de F_{n+k} qui domine une composante de $(F_{n+1})_{F_n}^k$. Notons que, puisque $(P_1, \dots, P_n)$ est définie sur L mais pas sur K , la fibre géométrique au-dessus de $y_{(P_1, \dots, P_n)} \in Y_n$ dans Y_{n+1} est un produit de deux courbes de genre g . Donc chaque courbe contenue dans cette fibre est de genre géométrique au moins g . La proposition 3, avec $D = F_{n+1}$ et $Z = F_n$, entraîne que pour k assez grand, la composante H_k de F_{n+k} est une variété de Lang. La conjecture de Lang entraîne que l'ensemble des points rationnels de H_k n'est pas dense dans H_k pour k assez grand, mais F_{n+k} est définie comme l'adhérence de Zariski de son ensemble de points rationnels.

Lemme 5bis: *Supposons que la conjecture de Lang soit vraie. Soit $y \in F_n$. Alors la dimension de la fibre de F_{n+k} au dessus de y est $2k$.*

Lemme 6 *Supposons que la conjecture de Lang soit vraie. Il existe une sous-variété $B' \subset B^2/S_2$ tel que pour k positif, si on écrit $I = \{n+1, \dots, n+k\}$ on a $\pi_I(F_{n+k}) = Y_{k, B'}$.*

Démonstration: Appliquons le lemme 5bis, et prenons B' égal à l'image de F_{n+k} dans B^2/S_2 .

Lemme 7 *On a $F_n = Y_{n,B'}$.*

Démonstration: Lemmes 3 et 6 (ou bien: prenons $n=0$ dans le lemme 6).

Conclusion: La proposition 1 dit que pour k assez grand, $Y_{k,B'} = F_k$ est une variété de Lang. Par définition, l'ensemble des points rationnels de F_k est dense. Par la conjecture de Lang F_k est vide, et vu le lemme 3, F_n l'est aussi.

Remarque: Pour démontrer le cas des corps de degré $d = 3$, on remplace $Y_n = \text{Sym}^2(X_B^n)$ par $\text{Sym}^3(X_B^n)$, et on montre comme ci-dessus que la dimension des fibres de $F_{n+1} \rightarrow F_n$ est au moins 2. On doit montrer que la dimension est 3. Pour achever ce but, on peut appliquer le théorème de Hassett [2] sur les familles de surfaces de type général, et démontrer que si la dimension des fibres est 2 et si k est assez grand, F_{n+k} est une variété de Lang.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] L. Caporaso, J. Harris, B. Mazur: *Uniformity of rational points*, preprint, 1994.
- [2] B. Hassett: *Fiber products of families of moduli stable surfaces have canonical singularities*, preprint, 1994.
- [3] S. Lang, *Hyperbolic diophantine analysis*. Bull. A.M.S. 14 (1986) p. 159-205.

Department of Mathematics, Boston University
111 Cummington Street, Boston, MA 02215
abrmovic@math.bu.edu